




選択的DPP-4阻害剤／糖尿病用剤 **Januvia®**
ジャヌビア錠 25mg 50mg 100mg
薬価基準収載 [シタグリプチンリン酸塩水和物錠]

処方せん医薬品：注意－医師等の処方せんにより使用すること

製造販売元【資料請求先】
MSD MSD株式会社
 〒102-8667 東京都千代田区九段北 1-13-12 北の丸スクエア
<http://www.msd.co.jp/>

【効能・効果】、【用法・用量】、【用法・用量に関連する使用上の注意】、【禁忌を含む使用上の注意】等については、製品添付文書をご参照ください。

2011年6月作成
 JAN11AD013-0616



5-HT₃ 受容体拮抗型制吐剤 薬価基準収載
 劇薬、処方せん医薬品（注意－医師等の処方せんにより使用すること）

アロキシ® 静注 0.75mg
Aloxi® I.V. injection 0.75mg
 パロノセトロン静注製剤

効能・効果、効能・効果に関連する使用上の注意、用法・用量、用法・用量に関連する使用上の注意、禁忌を含む使用上の注意等については、添付文書をご参照ください。

資料請求先（医薬品情報室）
大鵬薬品工業株式会社
 〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27
<http://www.taiho.co.jp/>

提携先 **HELSINN** スイス

本広告の象は、映画「星になった少年」（2005年公開）に出演したアジア象の“ランディ”です。なお、耳と牙は別のアフリカ象との合成です。

2011年4月作成



選択的ヒスタミンH₁受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 薬価基準収載

タリオン[®] 錠5mg・錠10mg
OD錠5mg・OD錠10mg

TALION[®] Tablets 5mg・Tablets 10mg (ペボタスチンベシル酸塩製剤)

TALION[®] OD Tablets 5mg・OD Tablets 10mg (ペボタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠)

処方せん医薬品 (注意-医師等の処方せんにより使用すること)

※効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については、添付文書をご参照ください。

提携
宇都興産株式会社



製造販売元 (資料請求先)
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区北浜2-6-18

2009年10月作成



神奈川県・相模原公園噴水広場

泌尿器領域は、アステラス。

過活動膀胱治療剤
(コハク酸ソリフェナシン錠)

薬価基準収載

ベシケア[®] 錠2.5mg/5mg
OD錠2.5mg/5mg

処方せん医薬品
(注意-医師等の処方せんにより使用すること)

Vesicare[®]

前立腺肥大症の排尿障害改善剤
(タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠)

薬価基準収載

ハルナールD[®] 錠0.1mg
0.2mg

処方せん医薬品
(注意-医師等の処方せんにより使用すること)

Harnal[®] D

アステラス製薬株式会社

東京都板橋区蓮根3-17-1

[資料請求先] 本社/東京都中央区日本橋本町2-3-11

■ご使用に際しましては、製品添付文書をご参照ください。

がんと、対話する。

頭の中が真っ白になった。

がんとのお会いを、そんなふうに振り返る人は多い。

まさか自分が。なぜ自分が？

ある日突然もたらされる不安、悲しみ、そして孤独。

でも、がんは、一方的に絶望を押しつけたりはしない。

気持ちが少し落ちたら、顔を上げ、がんに向き合ってみる。

私たちアストラゼネカは、医療にかかわる一員として、

さまざまな活動を通じ、患者さんはもちろん、

そのご家族や医療関係者など、

病氣と向き合うすべての人たちの心の支えとなる活動に、

今、取り組んでいます。

がんとのお話、それは人生との対話、希望との対話。

アストラゼネカは、これからもチャレンジしつづけます。

がんになっても

検索

<http://www.az-oncology.jp>

がんになっても、希望と、あたりまえの生活を。

アストラゼネカ株式会社

〒531-0076 大阪市北区大淀中1丁目1番88号

<http://www.astrazeneca.co.jp>

アストラゼネカは英国に本社を置く新薬開発をリードする世界的な医薬品企業です。

AstraZeneca 
Oncology

高親和性AT₁レセプターブロッカー

薬価基準収載

オルメテック錠[®] 5mg 10mg
20mg 40mg

処方せん医薬品：注意—医師等の処方せんにより使用すること
—一般名／オルメサルタン メドキシミル

※効能・効果、用法・用量および禁忌を含む使用上の
注意等については製品添付文書をご参照ください。



Daiichi-Sankyo

製造販売元（資料請求先）

第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1

2013年3月作成



高脂血症治療剤

(処方せん医薬品) 注意—医師等の処方せんにより使用すること

リピディル®


(フェノフィブラート錠)

錠 53.3mg
錠 80mg

製造販売 あすか製薬株式会社
東京都港区芝浦二丁目5番1号 原産国 Laboratoires FOURNIER S.A. (France)

LIPIDIL®

2011年12月
新発売



経口PGI₂誘導体製剤

(創薬) (処方せん医薬品) 注意—医師等の処方せんにより使用すること

プロサイリン®

錠 20

(日本薬局方 ヘラプロストナトリウム錠)

PROCYLIN®



科研製薬株式会社

●各製品の効能・効果、用法・用量、禁忌・原則禁忌を含む使用上の注意等の
詳細は、添付文書をご参照ください。 ●各製品共、薬価基準収載

(資料請求先)

科研製薬株式会社 医薬品情報サービス室
〒113-8650 東京都文京区本駒込2-28-8

(2011年11月作成) 05C9