

# 胃癌

2020/3/1

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
S-1+CDDP	S-1	80 mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服	d1夕-22朝	35日	胃癌
	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d8		
SOX	S-1	80 mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	胃癌
	オキサリプラチン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
CapeOX	カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	胃癌
	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
S-1+DTX	S-1	80 mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	胃癌
	ドセタキセル	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	d1		
Ramucirumab +PTX	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 60分	d1,15	28日	胃癌
	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d1,8,15		
Ramucirumab +nab-PTX	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 60分	d1,15	28日	胃癌
	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,8,15		
Nivolumab	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注 30分	d1	14日	胃癌

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。