

# 大腸癌

2020/3/1

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1	14日	大腸癌
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	d1		
FOLFIRI	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	d1	14日	大腸癌
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	d1		
XELOX	カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	大腸癌
	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
SOX	S-1	80 mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	大腸癌
	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
FOLFOXIRI	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	d1	14日	大腸癌
	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	d1		

AVA5 +mFOLFOX6	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	14日	大腸癌
	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	d1		
AVA5 +FOLFIRI	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	14日	大腸癌
	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	d1		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	d1		
AVA7.5 +XELOX	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	21日	大腸癌
	カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 5分	d1		

ベクティビックス +mFOLFOX6	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注 30分	d1	14日	大腸癌
	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	d1		
ベクティビックス +FOLFIRI	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注 30分	d1	14日	大腸癌
	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	d1		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	d1		
Ramucirumab +FOLFIRI	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 1時間	d1	14日	大腸癌
	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	d1		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	d1		

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。