

肝臓癌、胆道癌、膵癌

2020/3/1

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8,15	28日	胆道癌、膵癌
GEM+S-1	S-1	60 mg/m ² *	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	胆道癌、膵癌
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8,15		
	*S-1は添付文書の用量より1段階減量 (体表面積1.25m ² 未満の場合は、60 mg/日)					
GEM+CDDP	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8	21日	胆道癌
	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注 60分	d1,8		
GEM+nab-PTX	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8,15	28日	膵癌
	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	125 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8,15		
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	14日	膵癌
	イリノテカン	180 mg/m ²	点滴静注 90分	d1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。