

造血器腫瘍

2020/3/1

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
ABVD	ビンブラスチン	6 mg/m ² (最大10 mg/body)	静注	d1,15	28日	ホジキンリンパ腫
	ブレオマイシン	9 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,15		
	ドキソルビシン	25 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,15		
	ダカルバジン	375 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,15		
R-CHOP	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注 3~4時間	d1*	21日	非ホジキン リンパ腫
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ² (最大2.0 mg/body)	静注	d2		
	ドキソルビシン	50 mg/m ²	点滴静注 30分	d2		
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	点滴静注 2時間	d2		
	プレドニゾロン	100 mg/body	1日2回 内服	d2-6		
	*リツキシマブ投与日は前後することがあります					
Bd	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注射	d1,4,8,11	21日	多発性骨髄腫
	デキサメタゾン	20 mg/body	1日1回 内服	d1,2,4,5, 8,9,11,12		
Ld	レナリドミド	25 mg/body	1日1回 内服	d1-21	28日	多発性骨髄腫
	デキサメタゾン	40 mg/body	1日1回 内服	d1,8,15,22		
Pd	ポマリドミド	4mg/body	1日1回 内服	d1-21	28日	多発性骨髄腫
	デキサメタゾン	40 mg/body	1日1回 内服	d1,8,15,22		

CFZ 週1回+DEX	カルフィルゾミブ	70 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8,15	28日	多発性骨髄腫
	デキサメタゾン	40 mg/body	点滴静注 30分	d1,8,15		
	デキサメタゾン	40 mg/body	1日1回 内服	d22		
Dara+Bd	ダラツムマブ	16 mg/kg	点滴静注 3~4時間	d1,8,15	21日	多発性骨髄腫
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注射	d1,4,8,11		
	デキサメタゾン	20 mg/body	点滴静注 60分	d1,8,15		
	デキサメタゾン	20 mg/body	1日1回 内服	d2,4,5, 9,11,12		
	*ダラツムマブは4サイクル目以降はd1のみ、9サイクル目以降は4週おきに1回投与					
	*ボルテゾミブは9サイクル目以降は投与しない					
Dara+Ld	ダラツムマブ	16 mg/kg	点滴静注 3~4時間	d1,8,15,22	28日	多発性骨髄腫
	レナリドミド	25 mg/body	1日1回 内服	d1-21		
	デキサメタゾン	20 mg/body	点滴静注 60分	d1,8,15,22		
	デキサメタゾン	20 mg/body	1日1回 内服	d2,9,16,23		
	*ダラツムマブは3サイクル目以降はd1,15、7サイクル目以降はd1のみ投与					

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。